 <p>WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY</p>	INSTRUKCJA	Strona 1 z 2
	Przygotowanie pacjenta do badań w Pracowni Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii	Nr 04.01.10/2

1. Cel: określenie podstawowych zasad przygotowania pacjentów do badań w pracowni.

2. Zakres:

- wszystkie badania wykonywane w Pracowni rentgenodiagnostyki i Pracowni ultrasonografii.

3. Postępowanie.

3.1. BADANIE KONTRASTOWE NEREK I DRÓG MOCZOWYCH (urografia, cystografia)


- dzień przed badaniem obowiązuje dieta uboga w węglowodany, bez owoców, warzyw, pokarmów zawierających błonnik, napojów gazowanych
- po ostatnim posiłku o godzinie 18.00 przyjąć doustny środek przeczyszczający (np. Bisacodyl, Alax lub inny w dawce odpowiedniej dla pacjenta), a wieczorem zastosować wlew doodbytniczy (np. gotowy do użycia preparat Enema)
- osoby mające problem ze wzdęciami mogą przyjąć np. Espumisan lub zamiennik
- w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia papierosów
- **badanie urograficzne** u niemowląt można wykonywać po 5-6 godzinach od ostatniego karmienia, bez dodatkowego przygotowania. Do badania należy zgłosić się z butelką pokarmu płynnego (mleko, herbata, woda przegotowana), niemowlę może być również karmione piersią matki.

3.2. BADANIE KONTRASTOWE PRZELYKU, ŻOŁĄDKA, DWUNASTNICY, PASAŻ JELIT

- w dniu poprzedzającym badanie ostatni lekkostrawny posiłek około godziny 17-18.00, w godzinach wieczornych dozwolone picie czystych płynów (niegazowana woda mineralna, herbata)
- w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia papierosów

3.3. BADANIE KONTRASTOWE JELITA GRUBEGO (kolografia)

- dzień przed badaniem ostatni posiłek o godzinie 13.00. Od tej godziny do godzin wieczornych należy przyjmować roztwór Fortrans/X-prep, tak aby pacjent wypił około 3-4 litrów roztworu przeczyszczającego (ilość zależna od wieku pacjenta)
- w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia papierosów

 <p>WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY</p>	INSTRUKCJA	Strona 2 z 2
	Przygotowanie pacjenta do badań w Pracowni Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii	Nr 04.01.10/2

3.4. ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO, STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH, ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ

- w dniu poprzedzającym badanie należy spożywać lekkostrawne posiłki (bez owoców, warzyw, słodczy, napojów gazowanych),
- po ostatnim posiłku o godzinie 18.00 przyjąć doustny środek przeczyszczający (np. Bisacodyl, Alax lub inny w dawce odpowiedniej dla pacjenta),
- osoby mające problem ze wzdęciami mogą przyjąć np. Espumisan lub zamiennik
- w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia papierosów

3.5. ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO (skolioza)

- pacjent zgłasza się do badania po 5-6 godzinach od ostatniego posiłku- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia papierosów

3.6. BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ

- w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać produktów wzdymających (napoje gazowane, słodczy, warzywa, owoce, ciemne pieczywo, kasze),
- zaleca się przyjęcie leków p/wzdęciowych np. Espumisan lub zamiennik
- w dniu badania pacjent pozostaje na czczo- bez jedzenia i picia, żucia gumy i palenia papierosów
- 1 godzinę przed badaniem należy przyjąć niegazowaną wodę mineralną, herbatę w ilości 2-4 szklanek (ilość zależna od pojemności pęcherza moczowego- wieku pacjenta)
- do badania USG wykonywanego w godzinach popołudniowych pacjent powinien pozostać na czczo przez 5-6 godzin od ostatniego posiłku oraz przyjąć płyny jak wyżej,
- badanie USG u niemowląt odbywa się tuż przed porą karmienia

3.7. USG NARZĄDÓW RODNYCH

- pacjentka zgłasza się do badania po przyjęciu ok. 1 litra napojów (niegazowana woda mineralna, herbata) z wypełnionym pęcherzem moczowym

**JEŻELI WCZEŚNIEJ PACJENT MIAŁ JUŻ WYKONYWANE BADANIA
NALEŻY PRZYNIĘŚĆ ZE SOBĄ WYNIKI TYCH BADAŃ.**